

社会福祉法人 ^{群馬} 済生会支部埼玉県済生会加須病院			
文書名	院内感染防止対策マニュアル 0-5：放射線科		
文書番号	感対-共手-マニュアル 0-5-1-220601	ページ	1 / 4

O-5：放射線科

放射線科感染症発病及び感染症疑い時の対応方法

MRSA

1. 感染症疑い時は発症時と同じ対応で行う。
2. 患者がサージカルマスク、N95マスクを使用している時はマスクの使用は不要。
3. 撮影後は環境クロスVロックにて扉のトッテ、装置のSW部、カセット等の接触部の清拭消毒を行なった後、通常業務を行なう。
4. 担当者は石鹼を使用し流水で手洗いを行った後、消毒液にて消毒を行う。
5. 原則として午後の最後に撮影を行う。

(MRSA・ポータブル撮影)

1. 撮影者は病棟看護師の指示に従い、入室前に手指消毒薬にて手を消毒後ビニールエプロン及びマスクを着用して入室する。
(退室後も再度消毒液にて手を消毒する)
2. カセットは、入室前にビニール袋を用意し、カセットを入れて撮影をする。
(ビニール袋は病室の感染用ゴミ箱に捨てる)
3. ビニール袋を使用せずに撮影を行った場合は、必ずカセットを環境クロスVロックにて清拭消毒し乾燥するまでは使用しない事。
4. 機器（ポータブル本体）は撮影終了後、接触部分を環境クロスVロックにて清拭消毒する。
5. 撮影者は石鹼を使用し手洗いを行った後、消毒液にて消毒を行う。
6. 基本的に撮影はポータブル撮影の最後に行う。

(自己習慣について)

1. 日頃から首より上部を手で触れない習慣を身につける。（メガネ、前髪、鼻等）
2. マスク着用指示期間外でもマスクを臨機応変に使用する。
3. 特に撮影前には触れない事（MRSAの伝播を防ぐ為）

結核疑い

1. 職員はN95マスクを（適正着用確認）、患者はサージカルマスクを着用する（患者のマスクがフィットしているか確認する事）
2. 検査終了後、検査室内の換気を最低1時間は実施する。
3. 基本的に撮影及び検査は最後に行う。

疥癬症

1. 必ずディスポ手袋を使用して撮影を行う。
2. 撮影終了後、接触部分を環境クロスVロックにて触れた部分を清拭する。
3. 担当者は石鹼を使用し手洗い後、手指消毒薬を用い消毒を行う。
4. 更衣に付いては出きるだけ患者本人の物で行う、検査着等を使用した時はビニール袋に入れて密封し、必ず疥癬と記入して一般リネンと共に出す。
5. ディスポシートを使用した時は検査後廃棄する。

社会福祉法人 ^{鳳陽} 済生会支部埼玉県済生会加須病院			
文書名	院内感染防止対策マニュアル 0-5：放射線科		
文書番号	感対-共手-マニュアル 0-5-1-220601	ページ	2 / 4

その他

その他の感染症については院内感染対策マニュアル書にそって対応する。

各撮影室及び検査室の予防対策

1. 上記対応方法を参考にして行う。
2. その他の感染症についても同一とする。

(毎朝行っている事)

1. 撮影室及び通路は水道水にて毎朝床掃除を行う（業者）
2. 消毒用アルコール（環境クロスVロックでも可）による撮影用補助具、撮影台、撮影機器等の機器を清拭消毒する（技師）

(適宜に行う事)

1. 手洗いをを行い、手指消毒薬にて消毒を行う事。
2. 消毒用アルコールで撮影台、補助具、撮影機器等の清拭消毒を行う。
3. カセットの汚れ等による清拭消毒は計画的に行う。

(環境に関すること)

1. 間仕切り等のカーテン交換。2回/年（汚れ等が多い時は臨時で交換）行う（業者）
2. 床の定期的清掃及びワックス塗り（1回/2ヶ月）（業者）

文書名	院内感染防止対策マニュアル 0-5：放射線科		
文書番号	感対-共手-マニュアル 0-5-1-220601	ページ	3 / 4

感染症名	使用薬剤	消毒方法	消毒時間	備考
CD トキシン	ルビスタ	清拭	乾燥したら OK	
インフルエンザ	エタノール	清拭	乾燥したら OK	飛沫感染
MDRP (多剤耐性緑膿菌)	エタノール	清拭	乾燥したら OK	
MRSA	エタノール	清拭	乾燥したら OK	
疥癬	エタノール	清拭	乾燥したら OK	
結核	エタノール	清拭 室外戸解放	乾燥したら OK	空気感染 ※N95 マスク※ 可能な限り時間を あける
麻疹	エタノール	清拭 室外戸解放	乾燥したら OK	空気感染 ※N95 マスク※ 可能な限り時間を あける

文書名	院内感染防止対策マニュアル 0-5：放射線科		
文書番号	感対-共手-マニュアル 0-5-1-220601	ページ	4 / 4

風疹	エタノール	清拭	乾燥したら OK	飛沫感染
水痘	エタノール	清拭 室外戸解放	乾燥したら OK	空気感染 ※N95 マスク※ 可能な限り時間を あける
O-157	エタノール	清拭	乾燥したら OK	
ノロウイルス	ルビスタ	清拭	乾燥したら OK	
ロタウイルス	エタノール	清拭	乾燥したら OK	
RS ウィルス	エタノール	清拭	乾燥したら OK	