

血液内科

DCyBorD(ダラキューロ+エンドキサン+ボルテゾミブ+デカドロン)療法

未治療の全身性 AL アミロイドーシス

[投与間隔]

1～2 コース目

4 週を 1 コース

	投与スケジュール											
薬剤(投与量)	1	2	...	8	9	...	15	16	...	22	23	...
ダラキューロ(15mL/body)	●			●			●			●		
エンドキサン錠(300mg/㎡/day)※1	●			●			●			●		
ボルテゾミブ(1.3mg/㎡/day)	●			●			●			●		
デカドロン(20mg/day)経口	●	●		●	●		●	●		●	●	

※1 シクロホスファミドは最高 500mg/body/day までとする。

[投与間隔]

3～6 コース目

4 週を 1 コース

	投与スケジュール											
薬剤(投与量)	1	2	...	8	9	...	15	16	...	22	23	...
ダラキューロ(15mL/body)	●						●					
エンドキサン錠(300mg/㎡/day)※1	●			●			●			●		
ボルテゾミブ(1.3mg/㎡/day)	●			●			●			●		
デカドロン(20mg/day)経口	●	●		●	●		●	●		●	●	

※1 シクロホスファミドは最高 500mg/body/day までとする。

[投与間隔]

7 コース以降

4 週を 1 コース

	投与スケジュール							
薬剤(投与量)	1	...	8	...	15	...	22	...
ダラキューロ(15mL/body)	●							
デカドロン(20mg/day)経口	●							